

Uro-Vaxom®

OM Pharma SA

Qu'est-ce que l'Uro-Vaxom et quand doit-il être utilisé?

Uro-Vaxom est un médicament d'origine biologique utilisé comme stimulant du système immunitaire pour augmenter vos défenses naturelles. Uro-Vaxom peut prévenir les infections à répétition du système urinaire, en particulier les cystites. Il peut aussi être utilisé en association avec les éventuels traitements prescrits lors des phases aiguës des infections urinaires.

Selon prescription du médecin.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Lorsque votre médecin vous a prescrit en même temps des antibiotiques ou des désinfectants urinaires, n'omettez pas de les prendre.

Quand Uro-Vaxom ne doit-il pas être pris?

Si vous êtes allergique aux lysats bactériens lyophilisés d'*Escherichia coli* ou à un des ingrédients de ce médicament (listé en section «Que contient Uro-Vaxom?»)

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise d' Uro-Vaxom?

En cas de réaction de la peau, de fièvre ou de gonflement localisé (œdème), arrêtez le traitement et informez votre médecin, car il peut s'agir de réactions allergiques.

Veuillez informer votre médecin si vous prenez des agents immunosuppresseurs. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les réactions immunitaires de l'organisme (par exemple suite à une greffe d'organe) et sont susceptibles de diminuer ou de bloquer l'effet du traitement par Uro-Vaxom.

L'administration d'Uro-Vaxom chez des enfants de 4 ans et moins n'est pas recommandée.

Rien n'indique à ce jour que l'aptitude à la conduite et la capacité à utiliser des machines puissent être affectées par la prise de Uro-Vaxom.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par capsule, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

Uro-Vaxom peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou si vous désirez le devenir adressez-vous à votre médecin.

Grossesse

Il est préférable d'éviter l'utilisation d'Uro-Vaxom pendant la grossesse (surtout pendant le premier trimestre).

Allaitement

Uro-Vaxom ne doit être utilisé pendant l'allaitement qu'après consultation avec votre médecin.

Comment utiliser Uro-Vaxom?

Traitement préventif et/ou de consolidation

1 capsule par jour, à prendre de préférence le matin à jeun, pendant 3 mois consécutifs.

Traitement des épisodes aigus: 1 capsule par jour, à prendre de préférence le matin à jeun, jusqu'à disparition des symptômes, mais au moins pendant 10 jours consécutifs.

L'utilisation et la sécurité d' Uro-Vaxom n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants de moins de 4 ans.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Uro-Vaxom peut-il provoquer?

Uro-Vaxom peut provoquer des effets indésirables:

Fréquent (peut concerner jusqu'à 1 personne sur 10)

Diarrhée, nausées, maux de tête, troubles digestifs, intolérance gastrique

Peu fréquent (peut concerner jusqu'à 1 personne sur 100)

Réactions allergiques, douleur abdominale, éruption cutanée, démangeaisons, fièvre

Très rare (concerne moins d' une personne sur 10'000)

Gonflement (œdème) de la bouche, gonflement des chevilles, des pieds ou des doigts, chute de cheveux

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C) dans son emballage d'origine. Uro-Vaxom doit être conservé dans un endroit sec et tenu hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Uro-Vaxom?

Principes actifs

6 mg de lysats bactériens lyophilisés d'*Escherichia coli*.

Excipients

Amidon (pré-gélatinisé), stéarate de magnésium, gallate de propyle (E 310), glutamate de sodium, mannitol.

Composition de l'enveloppe de la capsule: gélatine, oxyde de fer jaune (E 172), oxyde de fer rouge (E 172), dioxyde de titane (E 171).

Chaque capsule contient 2.85 mg de sodium.

Numéro d'autorisation

00598 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Uro-Vaxom? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballages de 30 et 90 *capsules*.

Titulaire de l'autorisation

OM Pharma SA, Rue du Bois du Lan 22, 1217 Meyrin/Suisse.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

17040 / 12.06.2020